

TÜRKİYE MİLLİ PEDIATRİ DERNEĞİ AŞI TAKVİMİ ÖNERİSİ*

	Doğum	1. ay	2. ay	4. ay	6. ay	9. ay	12. ay	15. ay	18. ay	24. ay	30. ay	4-6 yaş (veya ilkokula başlarken)	13-14 yaş (Adolesan)**	Diğer
Hepatit B	HBV ¹ (0-3 ay)												HBV**	
		HBV ² (1-4 ay)												
					HBV ³ (6-18 ay)									
BCG		BCG ¹										BCG ² ? PPD		
DBT			DBT ¹ (DaBT ¹)	DBT ² (DaBT ²)	DBT ³ (DaBT ³)				DBT ⁴ (DaBT ⁴)			DaBT ⁵ (DBT ⁵)		10 yılda bir dT
Polio			OPV ¹	OPV ²	OPV ³				OPV ⁴			OPV ⁵		
Hib			HIB ¹	HIB ²	HIB ³				HIB ⁴					
Kızamık						K ¹								
KKK								KKK ¹				KKK ²		
Suçiçeği							VZV ¹						VZV ^{1-2**}	
Hepatit A										HAV ¹	HAV ²			

* Tabloda önerilen yaşlarda aksama olduğu takdirde, şema aralıkları dikkate alınarak aşılar en kısa zamanda tamamlanmalıdır.

** Adolesan dönemde eksik aşilar mutlaka gözden geçirilerek tamamlanmalıdır. Hiç yapılmadıysa yaşına göre aşı takvimi uygulanmalıdır.

Hepatit B (HBV): Anne HBsAg (+) ise veya annenin durumu bilinmiyorsa 0-1-6 ay şeması uygulanmalıdır. Anne HbsAg (+) ise ilk aşı HBIG (0.5 ml) ile birlikte, ilk 12 saatte, ayrı enjektör ile farklı yerlere uygulanmalıdır. 2. doz 1. dozdan en az 1 ay, 3. doz 2. dozdan en az 2 ay (1. dozdan ise en az 4 ay) sonra yapılmalıdır, 3. doz 6. aydan önce yapılmamalıdır.

BCG: Tercihan 2-3. ayda olmak üzere 0-3 ay arası yapılabilir. İlk 6. ayda PPD yapılmadan daha sonra PPD yapılarak (negatifse) BCG yapılır. 6 yaşında PPD kontrolüyle 2. BCG aşısı yapılabilir. 6 yaştan sonra PPD negatif vakalara bir diğer alternatif olarak; aşı yapmadan 2 yılda bir PPD takibi önerilebilir.

DBT, DaBT: Tam hücre boğmaca aşısı (DBT) tercih edilmelidir, ancak aselüler boğmaca aşısı (DaBT) preparat da uygulanabilir. İlk 3 aşı 2-4-6. ayda veya 2-3-4. aylarda (Sağlık Bakanlığı önerisi) yapılabilir. 4-6 yaşında DaBT tercih edilmelidir. 7 yaşından sonra erişkin tip difteri aşısı kullanılır. 10 yılda bir erişkin tip difteri/tetanoz karması (dT) yapılır. OPV ve DBT 5. dozu 4-6 yaş arası veya ilkokul 1. sınıfta (7 yaş dahil) yapılabilir.

Polio (OPV, IPV): İlk 2 dozun aşıya bağlı paralizi riskini ortadan kaldırmak için mümkünse oral polio aşısı (OPV) yerine inaktif polio (IPV) aşısı olarak yapılması önerilir.

H. influenza tip B (HIB): Bazı tiplerde (PRP-OMP içeren) 6. ay dozu gerekmez. Ülkemizde yeterli sonuçlar elde edilinceye kadar DBaT ile 2-4-6. aylık aşılarla kombine edilmemesi önerilir. 15-60 ay arasında, daha önceden HIB aşısı olmadıysa tek doz yapılır.

Kızamık (K): Ülkemizin koşullarında 9. ayda kızamık aşısı yapılması önerilir.

Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak (KKK): 9. ayda kızamık aşısı yapılmadıysa 12. ayda, yapıldıysa 15. ayda yapılması önerilir. 4-6 yaşında tekrarı yapılır.

Suçiçeği (VZV): 12 yaş ve altında tek doz, 13 yaş ve üzerinde (suçiçeği geçirmediyse) 1 ay arayla 2 doz yapılır.

Hepatit A (HAV): 2 yaşından sonra 6-12 ay arayla 2 doz verilir. 6 yaşından sonra anti-HAV IgG negatifse aynı şekilde uygulanır. 6 yaşından önce anti HAV bakmadan aşı önerilir.

İnfluenza virus aşısı (IVV): Risk faktörü olan çocuklara 6 ay ve üzerinde önerilir, her yıl uygulanır. 8 yaş ve altında ilk kez yapıldığında 1 ay arayla 2 kez yapılır ve 9 yaş ve üzerinde veya tekrarlamalarda bir doz yapılır. Dozaj ve uygulamada aşı prospektüsü de dikkate alınır, genellikle 6-35. ayda yarım doz (0.25 ml) 3 yaş ve üzerinde 0.5 ml yapılır.

NOT: Türkiye Milli Pediatri Derneği'nin 2 Şubat 2002 tarihinde, İstanbul'da yapılan Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı'nda belirlendiği şekilde Prof. Dr. İbrahim İldırım, Prof. Dr. Güler Kanra, Prof. Dr. Kadriye Yurdakök, Prof. Dr. Gülbin Gökçay ve Prof. Dr. Mustafa Hacımustafaoğlu'ndan oluşan "Aşı Komisyonu"nun 15 Nisan 2002 tarihinde İstanbul'da yaptığı toplantıda hazırladığı ülkemiz için "Aşı Takvimi Önerisi", 10-12 Mayıs 2002 tarihlerinde Urfa'da yapılan Türkiye Milli Pediatri Derneği Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı'nda oybirliği ile kabul edilmiş ve ülkemiz hekimlerine duyurulmasına karar verilmiştir. Bu toplantıda, ülke gerçekleri ve bilimsel veriler dikkate alınarak rutin aşı takviminin her yıl yeniden belirlenmesi kararlaştırılmıştır.